

Dosificación (Motrin®, Advil®) del ibuprofeno

Administre cada 6 a 8 horas según sea necesario, pero no exceda las 4 dosis en 24 horas. El ibuprofeno es seguro únicamente para niños de 6 meses de edad en adelante.

Peso en libras (lbs.)	Dosis	Líquido (1 tsp) = 100mg/5ml	Tableta masticable (1) = 100mg	Tabletas (1) = 200mg
11-21 lbs.	50mg.	½ tsp. (2.5ml)	½	—
22-32 lbs.	100mg.	1 tsp. (5ml)	1	—
33-43 lbs.	150mg.	1 ½ tsp. (7.5ml)	1 ½	—
44-54 lbs.	200mg.	2 tsp. (10ml)	2	1
55-65 lbs.	250mg.	2 ½ tsp (12.5ml)	2 ½	1
66-87 lbs.	300mg.	3 tsp. (15ml)	3	1 ½
88 lbs. +	400mg.	4 tsp. (20ml)	4	2

****Tenga en cuenta que** el paracetamol y el ibuprofeno pueden administrarse de forma alternada cada 3 horas en niños con fiebre persistentemente alta. Por ejemplo, podría administrar Children's Tylenol a las 7:00 a. m., seguido de Children's Motrin a las 10:00 a. m. y Children's Tylenol nuevamente a la 1:00 p.m.

Acetaminophen (Tylenol®) Dosificación

Administre cada 4 a 6 horas según sea necesario, pero no exceda las 5 dosis en 24 horas.

Peso en libras (lbs.)	Elixir (1 cucharadita) = 160 mg/5ml	Tableta masticable (1) = 80mg	Fuerza junior (1 tableta) = 160mg	Fuerza regular (1 tableta) = 325mg
6-11 lbs.	¼ tsp (1.25ml)	—	—	—
12-17 lbs.	½ tsp (2.5ml)	—	—	—
18-23 lbs.	¾ tsp (3.75ml)	—	—	—
24-35 lbs.	1 tsp (5ml)	2	—	—
36-47 lbs.	1 ½ tsp (7.5ml)	3	—	—
48-59 lbs.	2 tsp (10ml)	4	2	1
60-71 lbs.	2 ½ tsp (12.5ml)	5	2 ½	1
72-95 lbs.	3 tsp (15ml)	6	3	1 ½
96 lb. +	—	—	4	2

**** Tenga en cuenta que,** en niños con fiebre persistentemente alta, se pueden administrar acetaminofén e ibuprofeno de forma alternada cada 3 horas. Por ejemplo, podría administrar Children's Tylenol a las 7:00 a. m., seguido de Children's Motrin a las 10:00 a. m. y Children's Tylenol nuevamente a la 1:00 p. m.